

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เดือนกันยายนตั้งครรภ์ห้าม “แอลกอฮอล์” เด็ดขาด!                      รายงานขึ้นใหม่ล่าสุดของสมาคมแพทย์กุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (เออพี) ซึ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุชัดเจนว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่ว่าจะอายุครรภ์มากน้อยเพียงใด ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเด็ดขาด ไม่ว่าจะในปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ไม่เข่นนั้นจะเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบในระยะยาวต่อทารกในครรภ์</p> <p>ศูนย์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ความผิดปกติของทารกแรกเกิดจากแอลกอฮอล์ดังกล่าวมีตั้งแต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหัวใจ, ตับ และกระดูก เช่นหัวใจบิดความสามารถในการได้ยินของเด็กทารกแรกเกิดอีกด้วย ในรายงานของเออพีชี้ว่า มารดาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ทำให้ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม “พิทัล แอลกอฮอล์ สเปกตรัม ดิสอร์เดอร์” (เอฟเออสตี) ซึ่งเป็นกลุ่มภาวะปัญหาทั้งในทางสภาพร่างกาย, พฤติกรรม และการเรียนรู้ของเด็กทารกอันเนื่องจากแอลกอฮอล์ นอกจากนั้น การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ยังทำให้ทารกเสี่ยงต่อการเป็นโรคในกลุ่ม “พิทัล แอลกอฮอล์ ชินโตรม” ซึ่งพบมากกว่า เพราะวินิจฉัยได้ยาก เนื่องจากอาการเหล่านี้เป็นความผิดปกติทางร่างกายเมื่อคลอด</p>	-	สื่อสารมวลชน เสียง เดิมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรม ทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network
นานาชาติ	<p>H7N9 บุกจีนซึ่งเป็นความเสี่ยงธุรกิจสัตว์ปีก</p> <p>รายงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่อ้างอิงถึงองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่า ทาง FAO ออกโรงเตือนการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาหน่วยงานในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัด นกสายพันธุ์ H7N9 จำนวน 2 รายซึ่งเป็นรายงานผู้ป่วยครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และ FAO คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่สัปดาห์ ตามที่เคยเกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการระบาดของโรคและซ่อง霍ว์การควบคุมความปลอดภัยของภาค อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในจีน จากการศึกษาของ FAO และองค์กรความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่าการขาดการควบคุมความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมที่ดีทำให้สถานการณ์ไวรัสไข้หวัดนกในเขตເອເຍຕະວັນອອກເຊີງໃຫ້ແຍ່ລົງ ແລະສ່ວນເສີມຮ້າຍແຮງຕ່ອງສຸພາພອງປະຊາຊົນແລະອຸຕສາທຽມສัตว์ປຶກ ດังนั้น FAO จึงเรียกร้องให้แต่ละประเทศเข้มงวดกฎหมายควบคุมความปลอดภัยและกฎหมายกักกัน สัตว์ปีก เพื่อลดความเสี่ยงจากไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์ H7N9 และสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย</p>	-	สื่อสารมวลชน เสียง เดิมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรม ทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>"ป้อนเหล้าให้ลูก"...เสียงด้วย ทำลายอนาคต</p> <p>นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า พฤติกรรมการป้อนเหล้าให้ลูกกินถือเป็นการกระทำของผู้ปกครองที่ไร้จิตสำนึกของความเป็นพ่อแม่</p> <p>ภก.สสกรนต์ ภาคโขคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สสค.) บอกว่า การที่สมาชิกในครอบครัวดื่มเหล้า แนวโน้มที่เด็กจะโตขึ้นมาเป็นนักดื่มที่มีปัญหามีมากกว่าปกติถึง 4 เท่า ยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองบุยงให้ลองดื่ม ยิ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นนักดื่มเร็วยิ่งขึ้นไปอีก</p>		สื่อสารความเสียง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network
ประเทศไทย	<p>ภัยเด็ก “ไวรัลโรต้า” อาจลวนหน้าหน่าว</p> <p>พญ.พัชร เกียรติสารพิภพ กุมารแพทย์ ด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลปิยะเวทกล่าวว่า ไวรัลโรต้าเป็นเชื้อไวรัสนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคห้องร่วงในเด็กเล็ก โดยมักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าหนาวซึ่งแตกต่างจากอาหารเป็นพิษทั่วไป ที่มักจะระบาดในหน้าร้อน โดยเชื้ออาจติดมากับมือ ของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อเมื่อเด็กสัมผัสและเอามือเข้าปาก เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงทำให้มีไข้ ปวดห้อง อาเจียนและห้องเสียได้ เด็กทุกคนมีโอกาสเกิดโรคนี้ แต่บางกลุ่มอาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าหรือรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น เช่น เด็กที่อยู่ในที่ที่มีเด็กจำนวนมาก เช่น โรงเรียนสถานเลี้ยงเด็ก ทารกอายุน้อย มีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ การป้องกันที่ดีที่สุดคือล้างมือออกสบู่บ่อยๆ ให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ คนดูแลเด็กควรล้างมือออกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนชงนมหรือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ชนิดกินให้ในเด็กอายุ 6-24 สัปดาห์ โดยพบว่า วัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันการเกิดโรค โดยเฉพาะการเกิดโรคขั้นรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี</p>		สื่อสารความเสียง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ระวัง!!!!ยุงลายชนิดนำโรคไข้สมองอักเสบจากนกสู่คน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำประชาชนช่วงฤดูหนาวไม่ควรอยู่ใกล้พื้นที่มีนกอพยพ เพราะอาจได้รับเชื้อโรคไข้สมองอักเสบโดยมียุงรำคำและยุงลายเป็นพาหะ พร้อมโควนวัตกรรมป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันการกัดของยุงพาหะได้ทุกชนิดได้นาน 5-7 ชั่วโมง โดยไม่ระคายเคืองต่อผิวนหนังและไม่มีกลิ่นrgbกวนผู้ใช้ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวจะมีการอพยพของนกจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราราเป็นจำนวนมาก นกเหล่านี้สามารถนำเชื้อโรคได้หลายชนิดทำให้มีการระบาดของโรคในพื้นที่ต่างๆ โดยที่เชื้อไม่ทำให้เก็บป่วย เช่น โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ (West Nile encephalitis) ซึ่งโรคดังกล่าวมียุงลายชนิดเป็นพาหะโดยเฉพาะยุงรำคำและยุงลาย ทั้งนี้ในประเทศไทย ยังไม่พบการระบาดของไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ พบรโรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยพบครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนั้นก็พบผู้ป่วยทุกปี แม้จะมีวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอีแล้ว แต่ในปี พ.ศ. 2558 ยังพบผู้ป่วยจากโรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) จำนวน 493 ราย จาก 54 จังหวัด เนื่องจากโรคนี้มีสาเหตุจากเชื้ออื่นด้วยและผู้ใหญ่บางรายไม่ได้ฉีดวัคซีน เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบที่สำคัญมี 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Japanese encephalitis virus (JEV) และเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus , WNV) ไวรัสทั้งสองชนิดจัดอยู่ใน Genus Flavivirus ซึ่งยังไม่มียาฟ้าเชื้อ ทั้งนองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นเชื้อที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดข้ามประเทศได้</p>	-	สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network
ประเทศไทย	<p>1) สร.เฝ้าระวัง "ไข้หวัดนก" หน้าหนาว กระทรวงสาธารณสุข กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศไทย เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาว เตือนประชาชนไม่ให้นำสัตว์ปีกที่กำลังป่วยหรือตายผิดปกติมารับประทาน เสียงติดเชื้อ และหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรืออยู่ในพื้นที่สัตว์ปีกป่วยตาย หรือหลังเดินทางกลับจากพื้นที่มีรายงานผู้ป่วย รับพบแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมงหรือโทรศัพย์ด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมดูแลรักษา 2) เฝ้าระวังนก 'หน้าหนาว' นพ.โสภณ เมฆอรุณ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ ขณะนี้เป็นช่วงรออยู่ต่อฤดูฝน กับหน้าหนาว แม้ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ตั้งแต่ปี 2549 และไม่มีรายงานการเกิดโรคในสัตว์ปีกตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แต่ยังคงระดับการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมควบคุมโรค ทำงานใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก เพื่อติดตามสถานการณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมตรวจยืนยันเชื้อไข้หวัดนก โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมให้การรักษาพยาบาล ขณะที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) คุ้มเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคที่ติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คน</p>	พ.ศ. 2549 พบ ผู้ป่วยยืนยันโรค ไข้หวัดนก เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.บางมูลนา ก	1) ทบทวนมาตรการ/ระบบเฝ้าระวัง/การเฝ้าระวังฯ/การส่งต่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 2) สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>มือเท้าฯระบาดหน้า 1-3 ขวบป่วยพุ่ง 3 หมื่น</p> <p>นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของโรคที่ควรเฝ้าระวังพิเศษในเด็กคือ โรคมือ เท้า ปากซึ่งมูลสำนักโรคติดต่อ วิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 พ.ย.58 พบรู้ป่วย ทั่วประเทศไทย 33,827 ราย เสียชีวิต 3 ราย อายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 1-3 ปี พบรู้ป่วย ถึง 71.9% จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ สุราษฎร์ธานี พะเยา น่าน เชียงราย ภูเก็ตจากข้อมูลพบว่าเกิดขึ้นในเด็กทารกและเด็กเล็ก ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ มีสาเหตุจากเชื้อเอโนโรไวรัสหลายชนิด โดยชนิดที่รุนแรง คือ เอโนโรไวรัส 71 การติดต่อเกิดจากได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนจากอุจจาระ ฟอย ละของน้ำมูกน้ำลายน้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปากการติดต่อทาง น้ำ หรืออาหารมีโอกาสเกิดได้น้อยยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่สามารถป้องกันได้ โดยรักษา สุขอนามัยส่วนบุคคล ส่วนการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการเข่น ใช้ยาลดไข้ ยา แก้ปวดส่วนใหญ่จะมีการไม่รุนแรงและหายได้เองอย่างไรก็ตาม หากบุตรหลานมี อาการป่วย ควรแยกเด็กป่วยเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆรับพาเด็กป่วยไป พับแพทย์</p>	จากข้อมูล ไม่พบผู้เสียชีวิต ปี 2557 อัตราป่วย 136.14 ปี 2558 (ม.ค-2 พ.ย. 58) 56.81 พบรู้ป่วยสูงสุด อ.วชิร บารมี, อ.วังทรายพูน, อ.สากเหล็ก พบรู้ป่วยสูงสุด อายุ 0-5 ปี	สื่อสารความ เสียง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิ ธรรมทั้งภายใน และภายนอก ผ่านช่องทาง ต่างๆเข่น ผ่าน ทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network โดยเน้นในกลุ่ม เด็ก 0-5 ปี
ประเทศไทย	<p>อีสุกอีใสระบาดหน้าป่วยแล้วครึ่งแสน</p> <p>นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ข้อมูลสำนักโรคติดต่อ วิทยาฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 ต.ค.58 พบรู้ป่วยโรคอีสุกอีใสทั่วประเทศไทย 45,582 ราย เสียชีวิต 1 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี, 7-9 ปี เมื่อโรคนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง แต่ในคนบางกลุ่มเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แก่ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ผู้ที่กินยากดภูมิต้านทาน ثارกแรกเกิด สารเม็ดครรภ์ ผู้สูงอายุป่วยเบาหวาน ผู้ป่วย มะเร็ง ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกัน บกพร่อง ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ</p>	จากข้อมูล ไม่พบผู้เสียชีวิต ปี 2557 อัตราป่วย 144.09 ปี 2558 (ม.ค-2 พ.ย. 58) 48.38 พบรู้ป่วยสูงสุดที่ อ. ลากเหล็ก อ.วังทราย พูน อ.คงเจริญ พบรู้ป่วยสูงสุด อายุ 0-5 ปี และกลุ่มวัยเรียน (6-14 ปี)	สื่อสารความ เสียงเติมภูมิ ปัญญา ภูมิ ธรรมทั้งภายใน และภายนอก ผ่านช่องทาง ต่างๆเข่น ผ่าน ทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network โดยเน้นในกลุ่ม เด็ก 0-5 ปี และกลุ่มวัย เรียน (6-14 ปี)

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จาก MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.เชียงรายคุมเข้ม 4 โรคระบาดเดือนปชช.ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว/เด็ก-ผู้สูงอายุควรอาใจใส่พิเศษ</p> <p>เชียงราย: นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงราย กล่าวว่าขบวนนี้เข้าสู่ช่วงท่องเที่ยวฤดูหนาว หรือไข้ชั้นแล้ว และอย่างยิ่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึงมกราคม 2559 เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ที่สุด บันยอดดอย ยอดภู และบริเวณที่ออกเขา จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและ มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ จึงเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย เตรียมรับมือกับโรคที่เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาว ได้แก่โรคไข้หวัดหรือ ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอีสุกอีส และโรคอุจจาระร่วง เพราะจากรายงาน ของงานระบบวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายช่วงเดือนตุลาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558 พบว่ามีประชาชนชาวเชียงราย ป่วยด้วยโรคไข้หวัดและ ไข้หวัดใหญ่ 608 ราย โรคปอดบวม 2,631 ราย โรคอีสุกอีส 663 รายและโรค อุจจาระร่วง 13,287 ราย โดยเฉพาะโรคปอดบวม พบรดับเสียชีวิตไปแล้ว 35 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งทั้ง 4 โรคนี้ประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ารับการรักษาที่ สถานบริการสาธารณสุขมากกว่าครึ่งอัน</p>	-	<p>สื่อสารความ เสี่ยงเต็มภูมิ ปัญญา ภูมิธรรม ทั้งภายในและ ภายนอกผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น พัฒนาสื่อ สื่อพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network โดยเน้นในกลุ่ม เด็ก 0-5 ปี และ กลุ่มผู้สูงอายุ</p>
จังหวัด	<p>เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร อาการร้อนแห้งแล้งส่งผลไฟไหม้บ้าน ใน จ.พิจิตร</p> <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยรถดับเพลิงในเขต อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จำนวนหลาย คัน ได้ช่วยกันดับเพลิงที่ลูกใหม่บ้านของ นางสังเวียน นันที อายุ 60 ปี ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.นิมมานะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงชั้นเดียว โดย ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน โดยไฟได้ไหม้บ้านหลังตั้งก่อตัวของหมดทั้งหลัง มูลค่า ความเสียหายประมาณ 3 แสนบาท แต่โชคดีที่เหตุการณ์เกิดในช่วงกลางวันจึงไม่มี ใครเสียชีวิต</p>	-	<p>ประสาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (สุขภาพจิต ,NCD) พื้นฟู สภาพจิตใจ ให้ ความช่วยเหลือ ด้านสุขภาพ เปื้องต้าน</p>